ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2026. Том 8, № 3 (402–424)
FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2026. Volume 8, No. 3 (402–424)

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(1.5.12. Зоология, 1.5.14. Энтомология, 1.5.16. Гидробиология)
ZOOLOGICAL RESEARCH
(1.5.12. Zoology, 1.5.14. Entomology, 1.5.16. Hydrobiology)

УДК 595.44(470.621)
DOI 10.52575/2712-9047-2026-8-3-402-424
EDN QUBITE

Пауки (Aranei) горы Тыбга и её окрестностей (Республика Адыгея, Россия)

А.В. Пономарёв[1], Ю.А. Чумаченко[2, 3]
[1] Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 41
[2] Майкопский государственный технологический университет, Россия, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
[3] Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, Россия, 385000, г. Майкоп, ул. Советская, 187
E-mail: ponomarev1952@mail.ru; ychumachenko73@mail.ru

Поступила в редакцию 10.04.2026; поступила после рецензирования 06.07.2026; принята к публикации 08.07.2026

Аннотация. В результате исследований, проведённых на горе Тыбга и в её окрестностях (Кавказский биосферный заповедник, Республика Адыгея, Россия) в 2017–2018 годах выявлено 106 видов пауков из 14 семейств. В видовом составе преобладают представители семейства Linyphiidae (39 видов). Впервые на территории России отмечен *Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846, на территории Кавказа – *Haplodrassus pseudosignifer* Marusik, Hippa et Koponen, 1966, *Agyneta olivacea* (Emerton, 1882), *Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833). Для территории Кавказского заповедника впервые приводится 24 вида, а для Республики Адыгея – 18 видов.

Ключевые слова: пауки, Кавказский биосферный заповедник, фауна, биоразнообразие

Финансирование: работа А.В. Пономарёва выполнена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 125011200139-7.

Для цитирования: Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2026. Пауки (Aranei) горы Тыбга и её окрестностей (Республика Адыгея, Россия). *Полевой журнал биолога*, 8(3): 402–424. DOI: 10.52575/2712-9047-2026-8-3-402-424 EDN: QUBITE

Spiders (Aranei) of Mount Tybga and Its Environs (Republic of Adygea, Russia)

Alexander V. Ponomarev[1], Yuriy A. Chumachenko[2, 3]
[1] Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 41 Chekhova Ave, Rostov-on-Don 344006, Russia
[2] Maykop State Technological University, 191 Pervomaiskaya St, Maykop 385000, Russia
[3] Kh.G. Shaposhnikov Caucasian State Natural Biosphere Reserve, 187 Sovetskaya St, Maykop 385000, Russia
E-mail: ponomarev1952@mail.ru; ychumachenko73@mail.ru

Received April 10, 2026; Revised July 6, 2026; Accepted July 8, 2026

Abstract. The paper discusses the results of a survey of the spider fauna on the Tybga Mt. (Caucasian Biosphere Reserve, Republic of Adygea, Russia) conducted in 2017–2018. A total of 106 spider species in

© Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А., 2026

14 families have been recorded. Linyphiidae predominate (39 species) predominate in the species composition. The author presents the first record of *Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846 in Russia, and of *Haplodrassus pseudosignifer* Marusik, Hippa et Koponen, 1966, *Agynete olivacea* (Emerton, 1882), *Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833) in the Caucasus. The study allowed a first-ever record of 24 species in the Caucasus Nature Reserve, and of 18 species in Adygea.

Keywords: Araneae, Caucasian Biosphere Reserve, fauna, biodiversity

Funding: the work of A.V. Ponomarev was carried out within the framework of the State Project of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, project no. 125011200139-7.

For citation: Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2026. Spiders (Aranei) of Mount Tybga and Its Environs (Republic of Adygea, Russia). *Field Biologist Journal*, 8(3): 402–424 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2026-8-3-402-424 EDN: QUBITE

Введение

Данная статья является продолжением наших исследований фауны пауков Кавказского государственного биосферного заповедника. Ранее были представлены результаты изучения напочвенной аранеофауны участка «Тисо-самшитовая роща» [Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019] и Северного отдела заповедника на участке кордон Гузерипль – хребет «Пастбище Абаго» [Пономарёв, Чумаченко, 2014]. Кроме того, были опубликованы данные по фауне пауков кордона Черноречье [Пономарёв, Чумаченко, 2023]. Проведённые исследования показали значительное разнообразие и специфику аранеофауны обследованных участков заповедника, что связано с разницей в их природных условиях: колхидские леса (тисо-самшитовая роща), леса среднегорий и субальпийские луга (кордон Гузерипль, кордон Черноречье, хребет Пастбище Абаго). Так, в напочвенной фауне пауков тисо-самшитовой рощи было выявлено 72 вида из 27 семейств, участка Гузерипль – хребет «Пастбище Абаго» – 100 видов из 19 семейств, кордона Черноречье – 117 видов из 21 семейства. Кроме того, данные по аранеофауне заповедника имеются в работах А.В. Танасевича [Tanasevitch, 1987], В.И. Овчаренко [1978, 1979], Н.М. Ковблюка с соавторами [Kovblyuk et al., 2010], А.В. Пономарёва с соавторами [2012] и др. В общей сложности фауна пауков Кавказского заповедника насчитывала к настоящему времени не более 280 видов.

В предлагаемой статье представлены результаты изучения аранеофауны горы Тыбга и её окрестностей, входящей в состав Северного отдела Кавказского государственного биосферного заповедника.

Материал и методы исследования

Гора Тыбга (43.866074°N, 40.229133°E) расположена в Республике Адыгея на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника и достигает высоты 3063,3 м. От вершины в северо-восточном направлении отходят два отрога, между которыми протекает р. Безымянная (рис. 1). Исследования проводились в альпийском и субальпийском поясах. Альпийский пояс характеризуется осоковыми, кобрезиевыми,гераниевыми лугами и каменистыми участками и осыпями. В субальпийском поясе распространены субальпийские луга с высокотравьем, рододендроном кавказским и можжевельником; верхняя граница леса представлена криволесьем и редколесьем [Акатов и др., 2003].

Сбор материала осуществлялся авторами (в тексте далее: АП – А.В. Пономарёв, ЮЧ – Ю.А. Чумаченко) в весенне-летний период 2017 и 2018 годов у подножия г. Тыбга, на восточном её отроге, а также в долине р. Безымянной. Исследования проводились на высотах от 1860 до 2600 м н. у. м. Материал был собран ручным способом и с помощью почвенных ловушек. В качестве таких ловушек использовались пластмассовые стаканы объемом 0,5 и 0,2 л с 4 %-ным раствором формальдегида. Всего было собрано 1574 половозрелых особи пауков. Материал хранится в коллекции А.В. Пономарёва (ст. Раздорская, Ростовская область). Все фотографии выполнены А.В. Пономарёвым.



Рис. 1. Общий вид горы Тыбга (Республика Адыгея, Россия)
Fig. 1. General view of Mount Tybga (Republic of Adygea, Russia)

Были обследованы следующие биотопы:

1. Долина реки Безымянной – берёзовое криволесье (рис. 2, А) и берега реки (см. рис. 2, Б), 1869 м н. у. м. (43.903254°N, 40.270760°E);

2. Подножие г. Тыбга – заболоченный луг, 1910 м н. у. м. (43.901690°N, 40.271371°E), опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м. (43.894501°N, 40.274421°E), берёзовый лес, 2077 м н. у. м. (43.893133°N, 40.272898°E) (см. рис. 2, В), высокотравный субальпийский луг, 2040 м н. у. м. (43.894861°N, 40.271972°E) (см. рис. 2, Г), высокотравный субальпийский луг, 2100 м н. у. м. (43.891925°N, 40.272808°E);

3. Восточный отрог г. Тыбга – субальпийский луг, ксерофитный участок с можжевельником, 2300 м н. у. м. (43.885630°N, 40.272287°E), альпийский осоково-разнотравный луг, 2400 м н. у. м. (43.881870°N, 40.269393°E) (см. рис. 2, Д), кобрезиево-разнотравный альпийский луг, 2540 м н. у. м. (43.877639°N, 40.260889°E), кобрезиево-разнотравный альпийский луг (каменистый участок), 2600 м н. у. м. (43.872341°N, 40.254682°E) (см. рис. 2, Е).

Далее в аннотированном списке для каждого вида приводятся: известные данные о его находках в Кавказском заповеднике, описание собранного материала, распространение на Кавказе по известным опубликованным работам [Mikhailov, 1987; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, 2021; Пономарёв и др., 2021, 2025; Otto, 2022; Пономарёв, Чумаченко, 2023, 2026], а также с учётом полученных новых данных по Адыгее.



Рис. 2. Биотопы исследования аранеофауны на горе Тыбга и в её окрестностях в 2017–2018 гг. (Республика Адыгея, Россия):
А – берёзовое криволесье; Б – берег р. Безымянной; В – берёзовый лес;
Г – субальпийский луг; Д – альпийский осоково-разнотравный луг;
Е – кобрезиево-разнотравный альпийский луг (каменистый участок)
Fig. 2. Habitats studied for the spider fauna on Mount Tybga and its surroundings in 2017–2018 (Republic of Adygea, Russia):
A – birch elfin forest; Б – bank of the Bezymyannaya River; B – birch forest;
Г – subalpine meadow;
Д – alpine sedge-forb meadow; E – kobresia-forb alpine meadow (rocky area)

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2026. Том 8, № 3 (402–424)
FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2026. Volume 8, No. 3 (402–424)

Результаты исследования

Аннотированный список видов пауков, зарегистрированных на горе Тыбга и в её окрестностях

Семейство Agelenidae

1. *Pireneitega ovtchinnikovi* Kovbluyk, Kastrygina, Marusik et Ponomarev, 2013.

[Пономарёв и др., 2012; Kovblyuk et al., 2013 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, Абаго)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., 12.08.2018, 1♂, 4♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ), 03.07.2018–22.08.2018, 3♂, 1♀ (ЮЧ), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 8♂, 4♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок с можжевельником и рододендроном кавказским, 18.08.2018–20.08.2018, 1♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 21.08.2018–25.09.2018, 2♂, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 3♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 8♂, 5♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Грузия.

Семейство Anyphaenidae

2. *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802).

[Пономарёв, Чумаченко, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща)].

Материал: **2**, субальпийский пояс, 2033 м н. у. м., опушка берёзового леса, на рододендроне кавказском, 13.08.2018, 4♀ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 19.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Araneidae

3. *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer 1802).

[Овчаренко, 1977 (без указания конкретного участка); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., разнотравный луг, 17.08.2018, 3♀ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018–13.08.2018, 6♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ), 03.07.2018–23.08.2018, 4♂, 8♀ (ЮЧ, АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Адыгеи.

4. *Araneus diadematus* Clerck, 1758.

[Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

5. *Araneus quadratus* Clerck, 1758.

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., 12.08.2018, 1♀ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018–13.08.2018, 2♀ (АП), опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., 13.08.2018, 1♀ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 19.08.2018, 1♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 3♀ (ЮЧ), 03.07.2018–25.09.2018, 5♀ (АП, ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 2♀ (АП).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

6. *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1758).

[Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

7. *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1758).

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 1♂ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 1♀ (АП); **2**, опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., на рододендроне кавказском, 13.08.2018, 4♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия), Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

8. *Larinioides suspicax* (O. Pickard-Cambridge, 1876).

[Пономарёв и др., 2012 (как *L. folium*, без указания конкретного участка)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., разнотравный луг, 17.08.2018, 2♀ (АП), отвесный берег над галечником, 17.08.2018, 1♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 23.08.2017, 4♀ (ЮЧ), 03.07.2018–23.08.2018, 3♀ (АП, ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, на рододендроне кавказском, 18.08.2018–20.08.2018, 3♀ (АП), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 3♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 11.08.2018–21.08.2018, 1♂, 3♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Clubionidae

9. *Clubiona diversa* O. Pickard-Cambridge, 1862.

[Mikhailov, 1992 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–23.08.2018, 3♀ (АП, ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018–24.08.2018, 2♂, 25♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Азербайджан.

10. *Clubiona pseudosimilis* Michailov, 1990.

[Mikhailov, 1992 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв и др., 2012 (Лагонаки)].

Материал: **1**, отвесный берег над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 2♀ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 13.08.2018, 1♀ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 19.08.2018, 2♀ (АП), поляна, 11.08.2018, 1♂, 4♀ (АП), опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., на рододендроне кавказском, 13.08.2018, 6♂, 5♀ (АП), субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♂, 2♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–24.08.2018, 3♂, 6♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Cybaeidae

11. *Cryphoeca thaleri* Wunderlich, 1995.

[Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье); Ponomarev, Mikhailov, 2025 (хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки, Аспидный хребет, гора Тыбга и окрестности (берег реки Безымянной, опушка берёзового криволесья, берёзовый лес))].

Распространение на Кавказе: От Адыгеи и Краснодарского края до Азербайджана [Ponomarev, Mikhailov, 2025].

12. *Cybaeus abchasicus* Charitonov, 1947.

[Kovblyuk et al., 2010 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв и др., 2012 (г. Пшекиш, Абаго, Гузерипль); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–23.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край), Абхазия.

Семейство Gnaphosidae

13. *Drassodes pubescens* (Thorell., 1856).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 3♂, 16♀ (АП, ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–20.08.2018, 2♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 12♂, 4♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–24.08.2018, 15♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

14. *Drassyllus pusillus* (C.L. Koch, 1833).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 1♂, 3♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 3♂, 15♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

15. *Haplodrassus pseudosignifer* Marusik, Hippa et Koponen, 1966.

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 2♂ (АП, ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 19.08.2018–21.08.2018, 2♀ (АП).

Распространён от юго-восточной Европы до Центральной Азии и Ирана [WSC, 2025]. Новый вид для фауны Кавказа.

16. *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

17. *Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)], [Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)], [Пономарёв и др., 2023 (хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки, г. Тыбга (субальпийский луг, 2000 м н. у. м.))].

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан), Азербайджан.

18. *Parasyrisca caucasica* Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995

[Ovtsharenko et al., 1995; Пономарёв и др., 2012 (хр. «Пастбище Абаго», Чугуш, Псеашхо, г. Мраморная)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2600 м н. у. м., 19.08.2018–21.08.2018, 6♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия).

19. *Parasyrisca guzeripli* Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995

[Ovtsharenko et al., 1995 (хр. «Пастбище Абаго», Гузерипль, Чугуш, Псеашхо, г. Мраморная)], [Пономарёв и др., 2012 (Абаго, Лагонаки)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., галечник, 17.08.2018, 2♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–20.08.2018, 5♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–21.08.2018, 2♂, 5♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♂, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 45♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край).

20. *Phaeocedus braccatus* (L. Koch, 1866).

Материал: **3**, альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 19.08.2018–21.08.2018, 2♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

21. *Zelotes latreillei* (Simon, 1878).

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 14♂, 6♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

22. *Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839).

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 21.09.2018–25.09.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

Семейство Linyphiidae

23. *Agyneta olivacea* (Emerton, 1882).

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–10.08.2018, 1♂, 3♀ (ЮЧ).

Распространён в Северной Америке, Северной Европе, Монголии; в России от северной и восточной европейской части до Дальнего Востока [Nentwig et al., 2026; WSC, 2026]. Новый вид для фауны Кавказа.

24. *Agyneta rurestris* (C.L. Koch, 1836).

[Tanasevitch, 1987; Пономарёв, Михайлов, 2007; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго», Гузерипль, Тыбга, Чугуш); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♂ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–21.08.2018, 6♂, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

25. *Agyneta saaristoi* Tanasevitch, 2000.

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–22.08.2018, 1♂, 3♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан). Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

26. *Araeoncus* sp.

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., под камнями, 12.08.2018, 1♀ (АП).

Для точной диагностики вида необходимы самцы.

27. *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1832).

[Пономарёв и др., 2012 (Пшекиш, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 2♂, 9♀ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 2♀ (АП); **2**, субальпийский пояс, 2077 м н. у. м., берёзовый лес, поляна, 11.08.2018, 5♂ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 19.08.2018, 1♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 2♀ (ЮЧ), субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 3♂, 1♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–24.08.2018, 3♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 21.09.2018–25.09.2018, 1♂, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Грузия, Азербайджан.

28. *Bolyphantes* sp.

Материал: **2**, субальпийский пояс, 1890 м н. у. м., опушка берёзового леса, 13.08.2018, 1♀ (АП).

Отсутствие самцов в нашей коллекции не позволяет достоверно диагностировать вид.

29. *Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833).

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 3♂, 5♀ (ЮЧ).

Распространён в Европе, в том числе на территории Европейской России [Nentwig et al., 2026]. Новый вид для фауны Кавказа.

30. *Centromerita concinna* (Thorell, 1875).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский пояс, 1910 м н. у. м., заболоченный луг, 11.08.2018, 1♀ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия).

31. *Centromerus capucinus* (Simon, 1884).

Материал: **2**, берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия), Азербайджан. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

32. *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841).

[Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **1**, опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 2♀ (АП); **2**, берёзовый лес, 2077 м н. у. м, 11.08.2018–23.08.2018, 2♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 22.08.2018–25.09.2018, 1♂ (ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018–24.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия), Южная Осетия.

33. *Centromerus* sp.

Материал: **1**, опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 1♂ (АП).

Видовой статус вида не установлен; вероятно, новый для науки.

34. *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834).

[Танасевич, 1990; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018, 1♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–23.08.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

35. *Diplocephalus caucasicus* Tanasevitch, 1987.

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (Угловая Агепста)]; [Пономарёв и др., 2012 (Абаго)].

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 2♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея), Абхазия, Грузия.

36. *Diplocephalus latifrons* (O. Pickard-Cambridge, 1863).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (Гузерипль)]; [Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 2♀ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 1♀ (АП); **2**, берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

37. *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1832).

[Tanasevitch, 1987; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль)].

Материал: **2**, берёзовый лес, 2077 м н. у. м, 19.08.2018, 2♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия), Грузия, Азербайджан.

38. *Entelecara acuminata* (Wider, 1834).

[Tanasevitch, 1987 (Гузерипль)].

Материал: **2**, опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., на рододендроне кавказском, 13.08.2018, 1♀ (АП), берёзовый лес, 2077 м н. у. м, 19.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

39. *Gonatium rubens* (Blackwall, 1833).

[Tanasevitch, 1987 (Псеашхо)].

Материал: **1**, опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 1♂ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♀ (ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

40. *Hylyphantes nigritus* (Simon, 1881).

[Tanasevitch, 1987 (Чугуш); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

41. *Incestophantes amotus* (Tanasevitch, 1990).

[Танасевич, 1990 (как *Lepthyphantes amotus*); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Абаго)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018–24.08.2018, 9♂, 1♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан), Грузия.

42. *Macrargus carpenteri* (O. Pickard-Cambridge, 1894).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 21.09.2018–25.09.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия).

43. *Maso sundevalli* (Westring, 1851).

[Tanasevitch, 1987 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

44. *Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854).

[Танасевич, 1990; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (кордон Пслух, Абаго, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018– 10.08.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

45. *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830).

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 21.08.2018, 1♀ (АП); альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

46. *Oreoneta tatrica* (Kulczyński, 1915).

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 17.08.2018, 1♂, 1♀ (АП); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия). Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

47. *Palliduphantes pillichi* (Kulczyński, 1915).

[Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–23.08.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея).

48. *Panamomops sulcifrons* (Wider, 1834).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Абаго)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 24.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия).

49. *Peponocranium orbiculatum* (O. Pickard-Cambridge, 1882).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия), Грузия.

50. *Porrhomma montanum* Jackson, 1913

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия). Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

51. *Silometopus elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1872).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (г. Тыбга, 2250 м н. у. м.)].

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан).

52. *Silometopus incurvatus* (O. Pickard-Cambridge, 1873).

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–18.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия). Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

53. *Sintula corniger* (Blackwall, 1856).

[Танасевич, 1990 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 22.08.2018–25.09.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Северная Осетия), Абхазия, Азербайджан.

54. *Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (г. Тыбга, 2250 м н. у. м.)].

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия).

55. *Tenuiphantes aequalis* (Tanasevitch, 1987).

[Tanasevitch, 1987 (как *Lepthyphantes aequalis*); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2012 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 10♂, 1♀ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018, 2♀ (АП); берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 10♂, 2♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия), Армения.

56. *Tenuiphantes mengei* (Kulczyński, 1887).

[Tanasevitch, 1987 (Псеашхо); Пономарёв, Михайлов, 2007 (Гузерипль); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: повсеместно.

57. *Tenuiphantes morosus* (Tanasevitch, 1987).

[Танасевич, 1990 (как *Lepthyphantes morosus*, хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, отвесный берег реки над галечником, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–17.08.2018, 2♂, 6♀ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 2♀ (АП); **2**, берёзовый лес, 2077 м н. у. м., 11.08.2018–23.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

58. *Tenuiphantes tenuis* (Blackwall, 1852).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018, 1♂ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 1♀ (АП), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

59. *Trichoncus* sp.

Материал: **3**, альпийский луг, 2600 м н. у. м., 21.08.2018, 1♀ (АП).

Для точной диагностики вида необходимы самцы.

60. *Troglohyphantes charitonovi* Tanasevitch, 1987.

[Tanasevitch, 1987 (Псеашхо); Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща); Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский пояс, 2077 м н. у. м., берёзовый лес, 11.08.2018–23.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край), Абхазия.

61. *Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952).

[Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Южная Осетия.

Семейство Lycosidae

62. *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1758).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (Тыбга); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 3♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 7♂, 43♀ (ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 2♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 21♂, 54♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 5♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия.

63. *Arctosa leopardus* (Sundevall, 1832).

[Пономарёв и др., 2012 (Адыгея, без указания конкретной точки)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., луг, 12.08.2018, 1♂ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

64. *Hogna radiata* (Latreille, 1817).

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 22.08.2018–25.09.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

65. *Pardosa agrestis* (Westring, 1861).

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

66. *Pardosa buchari* Ovtsharenko, 1979.

[Овчаренко, 1979; Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ), 03.07.2018–25.09.2018, 36♂, 44♀ (АП, ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–21.08.2018, 48♂, 10♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 4♂, 9♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

67. *Pardosa caucasica* Ovtsharenko, 1979.

[Овчаренко, 1979 (Псеашхо, Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго», кордон Умпырь); Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки); Nadolny, Kovblyuk, 2012 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., луг, 12.08.2018, 2♀ (АП), опушка берёзового редколесья, 1869 м н. у. м., 12.08.2018–22.08.2018, 19♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 2♀ (ЮЧ), 03.07.2018–23.08.2018, 4♀ (АП, ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

68. *Pardosa incerta* Nosek, 1905.

[Овчаренко, 1979; Зюзин, Овчаренко, 1979 (хр. «Пастбище Абаго», Псеашхо, Чугуш); Пономарёв и др., 2012 (хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 2♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 6♂, 12♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♂, 3♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 4♂, 11♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

69. *Pardosa schenkeli* Lessert, 1904.

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–21.08.2018, 13♂, 2♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 4♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018–21.08.2018, 3♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан), Грузия. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

70. *Pardosa tasevi* Buchar, 1968.

[Овчаренко, 1979 (хр. «Пастбище Абаго», Гузерипль, Псеашхо, кордон Умпырь); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Абаго); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 2♂, 5♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–18.07.2018, 2♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

71. *Pardosa* sp.

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., разнотравный луг, 17.08.2018, 2♀ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 13.08.2018, 2♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 2♂, 14♀ (ЮЧ), 03.07.2018–25.09.2018, 103♂, 101♀ (ЮЧ), субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 2♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–20.08.2018, 5♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 136♂, 98♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 1♂, 5♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 1♂, 6♀ (АП).

Вид новый для науки, описание его будет дано в отдельной статье.

72. *Piratula hygrophila* (Thorell, 1872).

[Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., разнотравный луг, 12.08.2018–17.08.2018, 3♀ (АП), опушка берёзового редколесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 1♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия), Абхазия.

73. *Trochosa terricola* Thorell, 1856.

[Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 26♂, 16♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 5♂, 3♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 21.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

74. *Xerolycosa miniata* (C.L. Koch, 1834).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–22.08.2018, 10♂, 16♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–10.08.2018, 3♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Семейство Miturgidae

75. *Zora alpina* Kulczyński, 1915.

[Ponomarev, Mikhailov, 2024 (г. Тыбга, субальпийский луг)].

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия).

Семейство Philodromidae

76. *Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846.

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♂ (ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, на рододендроне кавказском, 18.08.2018–24.08.2018, 2♀ (АП).

Известное распространение: Средиземноморье, Швейцария, Словакия, Румыния, Молдова, Турция, Грузия [WSC, 2026]. Новый вид для фауны России.

77. *Thanatus coloradensis* Keyserling, 1880.

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 11.08.2018–25.09.2018, 1♂, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2540 м н. у. м., 22.08.2017, 2♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018–21.08.2018, 2♂, 3♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан). Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

78. *Thanatus formicinus* (Clerck, 1758)

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Грузия. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

79. *Thanatus* sp.

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 11.08.2018–25.09.2018, 2♀ (ЮЧ).

Вид новый для науки, описание его будет дано в отдельной статье.

80. *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802).

[Пономарёв и др., 2012 (хр. «Пастбище Абаго», Лагонаки); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Salticidae

81. *Attulus goricus* (Ovtsharenko, 1978).

[Овчаренко, 1978 (как *Sitticus goricus*, хр. «Пастбище Абаго», Псеашхо); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (везде как *Sitticus goricus*, хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 13♂, 3♀ (АП, ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 18.08.2018–20.08.2018, 4♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 11.08.2018–21.08.2018, 1♂ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 1♂, 3♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия), Грузия.

82. *Marpissa pomatia* (Walckenaer, 1802).

Материал: **2**, опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., на рододендроне кавказском, 13.08.2018, 1♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, на рододендроне кавказском, 18.08.2018–20.08.2018, 2♂, 4♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея), Южная Осетия, Грузия. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

83. *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853).

[Пономарёв, Чумаченко, 2007, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Чечня), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

84. *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826).

[Овчаренко, 1978 (без конкретного указания)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♂, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

85. *Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871).

[Пономарёв и др., 2012 (без конкретного указания места находки)].

Материал: **2**, опушка берёзового леса 2033 м н. у. м., 11.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Грузия.

86. *Talavera aequipes* (O. Picard-Cambridge, 1871).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (Тыбга)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 11.08.2018–21.08.2018, 1♂ (ЮЧ); альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария), Абхазия, Азербайджан.

Семейство Tetragnathidae

87. *Metellina merianae* (Scopoli, 1763).

[Пономарёв, Чумаченко, 2019 (участок Тисо-самшитовая роща)].

Материал: **1**, в углублениях отвесного берега реки, 1869 м н. у. м., 12.08.2018, 2♀ (АП); **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 2♀ (ЮЧ), 03.07.2018, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

88. *Metellina segmentata* (Clerck, 1758).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **1**, берег реки, 1869 м н. у. м., разнотравный луг, 17.08.2018, 1♀ (АП), отвесный берег над галечником, 12.08.2018–17.08.2018, 3♂, 5♀ (АП), опушка берёзового криволесья, 1869 м н. у. м., 22.08.2018, 1♂ (АП); **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 13.08.2018, 1♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♂, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

89. *Tetragnatha obtusa* C.L. Koch, 1837.

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 21.08.2017, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

Семейство Theridiidae

90. *Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834).

Материал: **2**, опушка берёзового леса, 2033 м н. у. м., 11.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия), Абхазия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

91. *Enoplognatha latimana* Hippa et Oksala 1982.

[Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 16.08.2018–24.08.2018, 2♂, 2♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♂ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения.

92. *Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833).

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Северная Осетия, Дагестан), Южная Осетия. Впервые отмечен на территории Кавказского заповедника.

93. *Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881).

[Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль)].

Материал: **2**, заболоченный луг, 1910 м н. у. м., 11.08.2018, 1♀ (АП), субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–23.08.2018, 2♀ (АП, ЮЧ); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 2♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

94. *Phylloneta sisyphia* (Clerck, 1758).

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия), Грузия. Впервые отмечен на территории Адыгеи и Кавказского заповедника.

95. *Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758).

[Пономарёв и др., 2012 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–21.08.2018, 3♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Thomisidae

96. *Misumena vatia* (Clerck, 1758).

[Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП); **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 20.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

97. *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801).

[Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–21.08.2018, 3♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия.

98. *Ozyptila orientalis balkarica* Ovtsharenko, 1979.

[Овчаренко, 1979 (хр. «Пастбище Абаго», Чугуш, Псеашхо, Мраморная); Пономарёв, Михайлов, 2007 (Абаго)].

Материал: **3**, альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан), Грузия.

99. *Ozyptila trux* (Blackwall, 1846).

[Пономарёв, Михайлов, 2007 (Тыбга); Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (Абаго); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 03.07.2018–22.08.2018, 5♂, 1♀ (ЮЧ), субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08–23.08.2018, 1♂ (АП); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 10♂, 2♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Ингушетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

100. *Xysticus bacurianensis* Mcheidze, 1971.

[Овчаренко, 1979 (хр. «Пастбище Абаго», Псеашхо, Чугуш, Мраморная); Пономарёв, Михайлов, 2007 (Тыбга)].

Материал: **3**, субальпийский луг, 2300 м н. у. м., ксерофитный участок, 24.08.2018, 1♀ (АП), альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–29.09.2018, 22♂, 3♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 8♂, 3♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан), Грузия.

101. *Xysticus bifasciatus* C.L. Koch, 1837.

[Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 10.08.2018–22.08.2018, 1♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–10.08.2018, 6♂, 1♀ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан. Впервые отмечен на территории Адыгеи.

102. *Xysticus gallicus* Simon, 1875.

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–25.09.2018, 7♂, 2♀ (ЮЧ), субальпийский луг, 2100 м н. у. м., 16.08.2018–23.08.2018, 1♀ (АП); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–25.09.2018, 5♂, 1♀ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 15.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

103. *Xysticus kochi* Thorell, 1872.

[Пономарёв и др., 2012 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 1♀ (ЮЧ), 22.08.2018–25.09.2018, 1♂ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 11.08.2018–21.08.2018, 1♂ (ЮЧ), альпийский луг, 2600 м н. у. м., 14.08.2018–21.08.2018, 1♀ (АП).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

104. *Xysticus lineatus* (Westring, 1851).

[Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Ингушетия), Грузия, Азербайджан.

105. *Xysticus spasskyi* Utotschkin, 1968.

[Овчаренко, 1979 (Гузерипль, Псеашхо, Чугуш); Пономарёв и др., 2012 (хр. «Пастбище Абаго», Гузерипль); Пономарёв, Чумаченко, 2014 (хр. «Пастбище Абаго»); Пономарёв, Чумаченко, 2023 (кордон Черноречье)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 5♂, 1♀ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 03.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

106. *Xysticus ukrainicus* Utotschkin, 1968.

[Овчаренко, 1979 (Гузерипль, хр. «Пастбище Абаго», Псеашхо, Чугуш); Пономарёв и др., 2012 (Абаго)].

Материал: **2**, субальпийский луг, 2040 м н. у. м., 02.07.2018–18.07.2018, 1♂ (ЮЧ); **3**, альпийский луг, 2400 м н. у. м., 18.07.2018–10.08.2018, 1♂ (ЮЧ).

Распространение на Кавказе: Россия (Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Ингушетия), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

Обсуждение результатов

На горе Тыбга и в её окрестностях было выявлено 106 видов пауков из 14 семейств. Из них *Haplodrassus pseudosignifer*, *Agyneta olivacea* и *Centromerita bicolor* впервые указываются для фауны Кавказа, а *Philodromus fuscolimbatus* – для фауны России. Новыми для Кавказского заповедника оказались 24 вида (*Larinioides patagiatus*, *Haplodrassus pseudosignifer*, *Phaeocedus braccatus*, *Zelotes latreillei*, *Zelotes petrensis*, *Agyneta olivacea*, *Agyneta saaristoi*, *Centromerita bicolor*, *Centromerus capucinus*, *Microlinyphia pusilla*, *Oreoneta tatrica*, *Porrhomma montanum*, *Silometopus incurvatus*, *Hogna radiata*, *Pardosa agrestis*, *Pardosa schenkeli*, *Philodromus fuscolimbatus*, *Thanatus coloradensis*, *Thanatus formicinus*, *Marpissa pomatia*, *Tetragnatha obtusa*, *Cryptachaea riparia*, *Enoplognatha thoracica* и *Phylloneta sisyphia*). Для фауны Адыгеи выявлено 18 новых видов (*Aculepeira ceropegia*, *Haplodrassus pseudosignifer*, *Zelotes petrensis*, *Agyneta olivacea*, *Agyneta saaristoi*, *Centromerita bicolor*, *Centromerus capucinus*, *Microlinyphia pusilla*, *Oreoneta tatrica*, *Porrhomma montanum*, *Silometopus incurvatus*, *Pardosa schenkeli*, *Philodromus fuscolimbatus*, *Thanatus coloradensis*, *Thanatus formicinus*, *Marpissa pomatia*, *Phylloneta sisyphia* и *Xysticus bifasciatus*). Два вида (*Pardosa* sp., *Thanatus* sp.) являются новыми для науки, их описания будут даны в отдельной статье.

В видовом составе явно преобладают Linyphiidae (39 видов). Семейства Gnaphosidae, Lycosidae и Thomisidae представлены 10, 13 и 11 видами соответственно. Остальные семейства насчитывают от одного (Agelenidae, Anyphaenidae, Miturgidae) до шести (Salticidae, Theridiidae) видов (см. таблицу).

Распределение пауков в обследованных в 2017–2018 гг. местообитаниях на г. Тыбга и её окрестностях (Адыгея, Россия)
Distribution of spiders in habitats surveyed in 2017–2018 on Mount Tybga and its environs (Republic of Adygea, Russia)

Виды пауков / Species of spiders	Местообитания / Habitats							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pireneitega ovtchinnikovi	+	–	–	–	+	+	+	+
Anyphaena accentuata	–	–	–	+	–	–	–	–
Aculepeira ceropegia	–	–	+	–	+	–	–	–
Araneus diadematus	–	–	–	–	+	–	–	–
Araneus quadratus	+	–	+	+	+	–	+	+
Araniella cucurbitina	–	–	–	–	+	–	–	–
Larinioides patagiatus	+	+	–	+	–	–	–	–
Larinioides suspicax	+	–	–	–	+	+	+	+
Clubiona diversa	–	–	–	–	+	–	–	–
Clubiona pseudosimilis	+	–	+	+	+	+	–	–
Cryphoeca thaleri	+	+	–	+	–	–	–	–
Cybaeus abchasicus	–	–	–	–	+	–	–	–
Drassodes pubescens	–	–	–	–	+	+	+	+
Drassyllus pusillus	–	–	–	–	+	–	+	–
Haplodrassus pseudosignifer	–	–	–	–	+	–	+	+
Micaria formicaria	–	–	–	–	+	+	–	–
Micaria pulicaria	–	–	–	–	+	–	–	–
Parasyrisca caucasica	–	–	–	–	–	–	–	+
Parasyrisca guzeripli	+	–	–	–	–	+	+	+
Phaeocedus braccatus	–	–	–	–	–	–	+	+
Zelotes latreillei	–	–	–	–	–	–	+	–
Zelotes petrensis	–	–	–	–	–	–	+	–
Agyneta olivacea	–	–	–	–	–	+	+	–
Agyneta rurestris	–	–	–	–	–	+	+	–

Продолжение таблицы
Continuation of Table

Виды пауков / Species of spiders	Местообитания / Habitats							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Agyneta saaristoi	–	–	–	–	+	–	–	–
Araeoncus sp.	+	–	–	–	–	–	–	–
Bolyphantes alticeps	+	+	–	+	+	+	+	–
Bolyphantes sp.	–	–	–	+	–	–	–	–
Centromerita bicolor	–	–	–	–	+	–	–	–
Centromerita concinna	–	–	+	+	–	–	–	–
Centromerus capucinus	–	–	–	+	–	–	–	–
Centromerus sylvaticus	–	+	–	+	+	+	–	–
Centromerus sp.	–	+	–	–	–	–	–	–
Dicymbium nigrum	–	–	+	–	+	–	–	–
Diplocephalus caucasicus	+	–	–	–	–	–	–	–
Diplocephalus latifrons	+	+	–	+	–	–	–	–
Drapetisca socialis	–	–	–	+	–	–	–	–
Entelecara acuminata	–	–	–	+	–	–	–	
Gonatium rubens	–	+	–	–	+	+	–	–
Hylyphantes nigritus	–	–	–	+	+	–	–	–
Incestophantes amotus	–	–	–	–	+	+	+	+
Macrargus carpenteri	–	–	–	–	–	–	+	–
Maso sundevalli	–	–	–	–	–	+	–	–
Micrargus herbigradus	–	–	–	–	–	–	+	–
Microlinyphia pusilla	–	–	–	–	–	+	+	–
Oreoneta tatrica	+	–	–	–	–	–	+	–
Palliduphantes pillichi	–	–	–	–	+	–	–	–
Panamomops sulcifrons	–	–	–	–	+	–	–	–
Peponocranium orbiculatum	–	–	–	–	+	–	–	–
Porrhomma montanum	–	–	–	–	–	–	+	–
Silometopus elegans	–	–	–	–	–	+	–	–
Silometopus incurvatus	–	–	–	–	–	–	+	–
Sintula corniger	–	–	–	–	+	–	–	–
Tapinocyboides pygmaeus	–	–	–	–	–	+	–	–
Tenuiphantes aequalis	–	+	+	+	–	+	–	–
Tenuiphantes mengei	–	–	–	–	–	+	–	–
Tenuiphantes morosus	+	+	–	+	–	–	–	–
Tenuiphantes tenuis	–	–	+	–	–	+	–	+
Trichoncus sp.	–	–	–	–	–	–	–	+
Troglohyphantes charitonovi	–	–	–	+	–	–	–	–
Walckenaeria alticeps	–	–	–	–	–	+	–	–
Alopecosa pulverulenta	–	+	–	–	+	+	+	+
Arctosa leopardus	+	+	–	–	–	–	–	–
Hogna radiata	–	–	–	–	+	–	–	–
Pardosa agrestis	–	–	–	–	+	–	–	–
Pardosa buchari	–	–	–	–	+	–	+	+
Pardosa caucasica	+	+	–	–	+	–	–	–
Pardosa incerta	–	–	–	–	+	–	+	+
Pardosa schenkeli	–	–	–	–	–	–	+	+
Pardosa tasevi	–	–	–	–	+	–	–	–
Pardosa sp.	+	–	+	–	+	+	+	+
Piratula hygrophila	+	+	–	–	+	–	–	–
Trochosa terricola	–	–	–	–	+	–	–	+
Xerolycosa miniata	–	–	–	–	+	–	+	–

Окончание таблицы
End of Table

Виды пауков / Species of spiders	Местообитания / Habitats							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zora alpina	–	–	–	–	+	–	–	–
Philodromus fuscolimbatus	–	–	–	–	+	+	–	–
Thanatus coloradensis	–	–	–	–	–	–	+	+
Thanatus formicinus	–	–	–	–	–	–	+	–
Thanatus sp.	–	–	–	–	–	–	+	–
Tibellus oblongus	–	–	–	–	+	–	–	–
Attulus goricus	–	–	–	–	+	+	+	+
Marpissa pomatia	–	–	–	+	–	–	–	–
Neon reticulatus	–	–	–	–	–	+	–	–
Phlegra fasciata	–	–	–	–	+	–	–	–
Pseudeuophrys lanigera	–	–	–	+	–	–	–	–
Talavera aequipes	–	–	–	–	–	–	+	+
Metellina merianae	+	–	–	–	+	–	–	–
Metellina segmentata	+	+	+	–	+	–	–	–
Tetragnatha obtusa	–	–	–	–	+	–	–	–
Cryptachaea riparia	–	–	–	+	–	–	–	–
Enoplognatha latimana	–	–	–	–	+	+	–	–
Enoplognatha thoracica	–	–	–	–	+	–	–	–
Phylloneta impressa	–	–	+	–	+	+	–	–
Phylloneta sisyphia	–	–	–	–	+	–	–	–
Steatoda bipunctata	–	–	–	–	+	–	–	–
Misumena vatia	–	–	–	–	+	+	–	–
Ozyptila atomaria	–	–	–	–	–	–	+	–
Ozyptila orientalis balkarica	–	–	–	–	–	–	–	+
Ozyptila trux	–	–	–	–	+	–	+	–
Xysticus bacurianensis	–	–	–	–	–	+	+	+
Xysticus bifasciatus	–	–	–	–	+	+	–	–
Xysticus gallicus	–	–	–	–	+	–	+	+
Xysticus kochi	–	–	–	–	+	–	+	+
Xysticus lineatus	–	–	–	–	+	–	–	–
Xysticus spasskyi	–	–	–	–	+	–	+	–
Xysticus ukrainicus	–	–	–	–	+	–	+	–
Всего видов:	19	14	10	20	58	30	38	24

Примечание. Местообитания: долина реки Безымянной: 1 – берег реки, 2 – берёзовое криволесье, включая опушку; подножие горы Тыбга: 3 – заболоченный луг, 4 – берёзовый лес, включая опушку, 5 – высокотравный субальпийский луг; восточный отрог горы Тыбга: 6 – субальпийский луг, ксерофитный участок, 7 – альпийский осоково-разнотравный луг, 8 – альпийский луг, каменистый участок.

Note. Habitats: Bezymyannaya River valley: 1 – river bank, 2 – birch elfinwood, including forest edge; foot of Tybga Mountain: 3 – marshy meadow, 4 – birch forest, including forest edge, 5 – tall-grass subalpine meadow; eastern spur of Tybga Mountain: 6 – subalpine meadow, xerophytic area, 7 – alpine sedge-forb meadow, 8 – alpine meadow, rocky area.

Наибольшее число видов выявлено на субальпийских лугах (71) (см. таблицу), причём 32 из них (*Araneus diadematus*, *Araniella cucurbitina*, *Clubiona diversa*, *Micaria formicaria*, *Micaria pulicaria*, *Agyneta saaristoi*, *Centromerita bicolor*, *Hylyphantes nigritus*, *Maso sundevalli*, *Palliduphantes pillichi*, *Panamomops sulcifrons*, *Peponocranium orbiculatum*, *Silometopus elegans*, *Sintula corniger*, *Tapinocyboides pygmaeus*, *Tenuiphantes mengei*, *Walckenaeria alticeps*, *Hogna radiata*, *Pardosa agrestis*, *Pardosa tasevi*, *Zora alpina*, *Philodromus fuscolimbatus*, *Tibellus oblongus*, *Neon reticulatus*, *Phlegra fasciata*, *Tetragnatha obtusa*, *Enoplognatha latimana*, *Enoplognatha thoracica*, *Phylloneta sisyphia*, *Steatoda bipunctata*, *Misumena vatia* и *Xysticus bifasciatus*) в других местообитаниях не выявлены.

Видовое разнообразие аранеофауны альпийских лугов значительно ниже (43 вида), тем не менее намного превосходит таковую других обследованных местообитаний (см. таблицу).

Следует отметить обеднённость лесной аранеофауны. В двух типах обследованных лесов обнаружено всего 27 видов (см. таблицу), причём к типично лесным из них можно отнести только 9 (*Anyphaena accentuata*, *Larinioides patagiatus*, *Diplocephalus latifrons*, *Drapetisca socialis*, *Entelecara acuminata*, *Troglohyphantes charitonovi*, *Pardosa caucasica*, *Pseudeuophrys lanigera* и *Cryptachaea riparia*).

Наименьшее число видов (10) зарегистрировано на заболоченном лугу (см. таблицу); характерно, что среди них отсутствуют формы, приуроченные к лугам избыточного увлажнения; в основном это мезофильные виды с довольно высокой пластичностью.

На берегу реки Безымянной обнаружено 19 видов (см. таблицу), из них только *Arctosa leopardus* является типичным обитателем пойменных лугов.

Таким образом, на обследованной территории именно субальпийские и альпийские луга отличаются не только разнообразием аранеофауны, но и значительной её специфичностью.

За помощь в определении пауков из семейства Linyphiidae авторы глубоко признательны А.В. Танасевичу (Москва, ИПЭЭ РАН).

Список литературы

Акатов В.В., Акатова Т.В., Ескин Н.Б. 2003. Состав и видовое богатство растительных сообществ высокогорных лугов и пустошей Кавказского заповедника и сопредельных территорий. *В кн.:* 80 лет Кавказскому заповеднику – путь от Великокняжеской охоты до Всемирного природного наследия. Юбилейный сборник трудов, посвященный 80-летию Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 17. Сочи, «Проспект»: 216–239.

Зюзин А.А., Овчаренко В.И. 1979. Таксономические заметки о *Pardosa incerta* Nosek (Aranei, Lycosidae) – новом виде паука в фауне СССР. *Труды Зоологического института АН СССР*, 85: 60–64.

Овчаренко В.И. 1977. Фауна и распределение пауков на территории Кавказского заповедника. *Вестник ЛГУ*, 9: 128.

Овчаренко В.И. 1978. Пауки сем. Salticidae (Aranei) Большого Кавказа. *Энтомологическое обозрение*, 57(3): 682–686.

Овчаренко В.И. 1979. Пауки семейств Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) Большого Кавказа. *Труды Зоологического института АН СССР*, 85: 39–53.

Пономарёв А.В. 2021. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея (Россия). *Полевой журнал биолога*, 3(3): 217–238. DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-217-238

Пономарёв А.В., Алексеев С.К., Комаров Ю.Е., Шматко В.Ю. 2021. Пауки (Aranei) долины Терека в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания, Россия. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 17(2): 351–374. DOI: 10.23885/181433262021172-351374

Пономарёв А.В., Ковблюк Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея. *В кн.:* Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи. Сборник научных статей. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН: 447–481.

Пономарёв А.В., Михайлов К.Г. 2007. Добавление к фауне пауков (Aranei) российского Кавказа. *В кн.:* Труды Южного научного центра Российской академии наук. Т. III. Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН: 130–151.

Пономарёв А.В., Прокопенко Е.В., Шматко В.Ю. 2023. *Micaria micans* (Blackwall, 1858) и *M. pulicaria* (Sundevall, 1831) (Aranei: Gnaphosidae) на юго-востоке Русской равнины и российском Кавказе. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 19(1): 49–56. DOI: 10.23885/181433262023191-4956

Пономарёв А.В., Турбанов И.С., Шматко В.Ю. 2025. Обзор фауны пауков (Aranei) Чеченской Республики, Россия. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 21(2): 237–260. DOI: 10.5281/zenodo.17465367

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2007. Паукообразные (Arachnida) в напочвенной мезофауне тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного биосферного заповедника. *В кн.:* Труды Южного научного центра Российской академии наук. Т. III. Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН: 151–163.

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2014. Пауки (Aranei) в напочвенной мезофауне Северо-Западного Кавказа. *Юг России: экология, развитие*, 2: 95–101. DOI: 10.18470/1992-1098-2014-2-95-101

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2019. Изменения в фауне пауков (Aranei) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника в связи с гибелью самшита. *Наука Юга России*, 15(1): 71–77. DOI: 10.7868/S25000640190108

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2023. Новые данные о пауках (Aranei) Кавказского природного биосферного заповедника. Пауки кордона Черноречье (Краснодарский край, Россия). *Полевой журнал биолога*, 5(3): 298–323. DOI: 10.52575/2712-9047-2023-5-3-298-323

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2026. Напочвенная фауна пауков (Aranei) предгорных районов Адыгеи (Россия). *Наука юга России*, 22(1): 77–86.

Танасевич А.В. 1990. Пауки семейства Linyphiidae фауны Кавказа (Arachnida, Aranei). *В кн.:* Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. М., Наука: 5–114.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2013. The spider genus *Pireneitega* Kishida, 1955 in the Caucasus (Aranei: Agelenidae: Coelotinae). *Arthropoda Selecta*, 22(1): 59–73.

Kovblyuk M.M., Ponomarev A.V., Dvadnenko K.V. 2010. Redescription of *Cybaeus abchasicus* Charitonov, 1947, with the first description of the male (Aranei: Cybaeidae). *Arthropoda Selecta*, 19(4): 221–225. DOI: 10.15298/arthsel.19.4.02

Mikhailov K.G. 1987. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae). *Spixiana*, 10(3): 219–334

Mikhailov K.G. 1992. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Arachnida Aranei Clubionidae) in the USSR fauna: a critical review with taxonomical remarks. *Arthropoda Selecta*, 1(3): 3–34.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2012. Members of *Pardosa amentata* and *P. lugubris* species groups in Crimea and Caucasus with notes on *P. abagensis* (Aranei: Lycosidae). *Arthropoda Selecta*, 21(1): 67–80. DOI: 10.15298/arthsel.21.1.06

Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Kropf C., Stäubli A. 2026. Spinnen Europas. Version 03.2026. Available at: https://www.araneae.nmbe.ch (accessed: March 18, 2026). DOI: 10.24436/1

Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 02.2022. Available at: https://caucasus-spiders.info/ (accessed: March 15, 2026).

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Marusik Yu.M. 1995. A review of the Holarctic ground spider genus *Parasyrisca* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates*, 3147: 1–55.

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G. 2025. Spiders of the genus *Cryphoeca* Thorell, 1870 (Aranei: Cybaeidae) in the Caucasus. *Arthropoda Selecta*, 34(4): 604–610. DOI: 10.15298/arthsel.34.4.12

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024. Review of the spider genus *Zora* C.L. Koch, 1847 (Aranei: Miturgidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. New data on the fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*, 33(4): 589–607. DOI: 10.15298/arthsel.33.4.13

Tanasevitch A.V. 1987. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana Biologica*, 67(4/6): 297–383.

World Spider Catalog. Version 27. 2026. Available at: http://wsc. nmbe.ch (accessed: March 20, 2026). DOI: 10.24436/2

References

Akatov V.V., Akatova T.V., Eskin N.B. 2003. Sostav i vidivie bogatstvo rastitelnykh soobshchestv vysokogornykh lugov i pustoshei Kavkazskogo zapovednika i sopredelnykh territorii [Composition and species richness of plant communities of high-mountain meadows and wastelands of the Caucasus Nature Reserve and adjacent territories]. *In:* 80 let Kavkazskomu zapovedniku – put ot Velikoknyazheskoi okhoty do Vsemirnogo prirodnogo naslediya [80 years of the Caucasus Nature Reserve – the journey from the Grand Duke's hunt to a World Natural Heritage Site]. Anniversary collection of works dedicated to the 80th anniversary of the Caucasian State Nature Biosphere Reserve. Issue 17. Sochi, "Prospect": 216–239.

Zyuzin A.A., Ovtsharenko V.I. 1979. Taxonomic notes about the *Pardosa incerta* Nosek (Aranei, Lycosidae), a new species of spider of the USSR fauna. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR*, 85: 60–64 (in Russian).

Ovtsharenko V.I. 1977. Fauna i raspredelenie paukov na territorii Kavkazskogo zapovednika [Fauna and distribution of spiders in the territory of the Caucasian Reserve]. *Vestnik LGU*, 9: 128.

Ovtsharenko V.I. 1978. Spiders of the family Salticidae (Aranei) from the Caucasus Major. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 57(3): 682–686 (in Russian).

Ovtsharenko V.I. 1979. Spiders of the families Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) in the Great Caucasus. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR*, 85: 39–53 (in Russian).

Ponomarev A.V. 2021. Supplement to spider fauna (Aranei) of Adygea Republic (Russia). *Field Biologist Journal,* 3(3): 217–238 (in Russian). DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-217-238

Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Komarov Yu.E., Shmatko V.Yu. 2021. Spiders (Aranei) of the Terek River valley in Mozdok District of the Republic of North Ossetia – Alania, Russia. *Caucasian Entomological Bulletin*, 17(2): 351–374 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262021172- 351374

Ponomarev A.V., Kovblyuk N.M., Chumachenko Yu.A., Volkova D.D. 2012. Predvaritel'nyye dannyye po faune paukov (Aranei) Respubliki Adygeya [Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of Adygea]. *In:* Sotsial'no-gumanitarnyye i ekologicheskiye problemy razvitiya sovremennoy Adygei [Social-humane and ecological problems of development of contemporary Adygea]. Collection of scientific papers. Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 447–481.

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G. 2007. Dobavleniye k faune paukov (Aranei) rossiyskogo Kavkaza [Addition to fauna of spiders (Aranei) of the Russian Caucasus]. *In:* Trudy Yuzhnogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. T. 3. Bioraznoobrazie i transformatsiya gornykh ekosistem Kavkaza [Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Vol. 3. Biodiversity and transformation of mountain ecosystems of Caucasus]. Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 130–151.

Ponomarev A.V., Prokopenko E.V., Shmatko V.Yu. 2023. *Micaria micans* (Blackwall, 1858) and *M. pulicaria* (Sundevall, 1831) (Aranei: Gnaphosidae) in the southeast of the Russian Plain and the Russian Caucasus. *Caucasian Entomological Bulletin*, 19(1): 49–56 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262023191-4956

Ponomarev A.V., Turbanov I.S., Shmatko V.Yu. 2025. Review of the spider fauna (Aranei) of the Chechen Republic, Russia. *Caucasian Entomological Bulletin*, 21(2): 237–260 (in Russian). DOI: 10.5281/zenodo.17465367

Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2007. Paukoobraznyye (Arachnida) v napochvennoy mezofaune tiso-samshitovoy roshchi Kavkazskogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika [Arachnida in ground mesofauna of yew-box grove of the Caucasian Biospheric Reserve]. *In*: Trudy Yuzhnogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. T. III: Bioraznoobrazie i transformatsiya gornykh ekosistem Kavkaza [Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Issue III: Biodiversity and transformation of mountain ecosystems of Caucasus]. Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 151–163.

Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2014. Spiders (Aranei) in herpetobiont mesofauna of the Northwest Caucasus. *South of Russia: ecology, development*, 2: 95–101 (in Russian).

Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2019. Changes in the fauna of spiders (Aranei) of the yew-boxwood grove of the Caucasus Reserve in connection with the death of boxwood. *Nauka Yuga Rossii*, 15(1): 71–77 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640190108

Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2023. New data on spiders (Aranei) of the Caucasus Nature Reserve. Spiders of the cordon Chernorechye (Krasnodar Kray, Russia). *Field Biologist Journal*, 5(3): 298–323 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2023-5-3-298-323

Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2026. Ground fauna of spiders (Aranei) of the foothill regions of Adygea (Russia). *Science in the South of Russia*, 22(1): 77–86 (in Russian).

Tanasevitch A.V. 1990. The spider family Linyphiidae in the fauna of the Caucasus (Arachnida, Aranei). *In:* Fauna nazemnykh bespozvonochnykh Kavkaza [Fauna of terrestrial invertebrates of the Caucasus]. Moscow, Publ. Nauka: 5–114.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2013. The spider genus *Pireneitega* Kishida, 1955 in the Caucasus (Aranei: Agelenidae: Coelotinae). *Arthropoda Selecta*, 22(1): 59–73.

Kovblyuk M.M., Ponomarev A.V., Dvadnenko K.V. 2010. Redescription of *Cybaeus abchasicus* Charitonov, 1947, with the first description of the male (Aranei: Cybaeidae). *Arthropoda Selecta*, 19(4): 221–225. DOI: 10.15298/arthsel.19.4.02

Mikhailov K.G. 1987. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae). *Spixiana*, 10(3): 219–334

Mikhailov K.G. 1992. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Arachnida Aranei Clubionidae) in the USSR fauna: a critical review with taxonomical remarks. *Arthropoda Selecta*, 1(3): 3–34.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2012. Members of *Pardosa amentata* and *P. lugubris* species groups in Crimea and Caucasus with notes on *P. abagensis* (Aranei: Lycosidae). *Arthropoda Selecta*, 21(1): 67–80. DOI: 10.15298/arthsel.21.1.06

Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Kropf C., Stäubli A. 2026. Spinnen Europas. Version 03.2026. Available at: https://www.araneae.nmbe.ch (accessed: March 18, 2026). DOI: 10.24436/1

Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 02.2022. Available at: https://caucasus-spiders.info/ (accessed: March 15, 2026).

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Marusik Yu.M. 1995. A review of the Holarctic ground spider genus *Parasyrisca* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates*, 3147: 1–55.

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G. 2025. Spiders of the genus *Cryphoeca* Thorell, 1870 (Aranei: Cybaeidae) in the Caucasus. *Arthropoda Selecta*, 34(4): 604–610. DOI: 10.15298/arthsel.34.4.12

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024. Review of the spider genus *Zora* C.L. Koch, 1847 (Aranei: Miturgidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. New data on the fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*, 33(4): 589–607. DOI: 10.15298/arthsel.33.4.13

Tanasevitch A.V. 1987. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana Biologica*, 67(4/6): 297–383.

World Spider Catalog. Version 27. 2026. Available at: http://wsc. nmbe.ch (accessed: March 20, 2026). DOI: 10.24436/2

Конфликт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось.
Conflict of interest: no potential conflict of interest related to this article was reported.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Пономарёв Александр Викторович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия

Чумаченко Юрий Алексеевич, кандидат биологических наук, доцент, Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп, Россия; старший научный сотрудник, Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, г. Майкоп, Россия

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Alexander V. Ponomarev, Candidate of Biological Sciences, Leading Researcher, Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia
ORCID: 0000-0001-7448-0383

Yuriy A. Chumachenko, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Maykop State Technological University, Maykop, Russia; Senior Researcher, Kh.G. Shaposhnikov Caucasian State Natural Biosphere Reserve, Maykop, Russia
ORCID: 0000-0003-0604-9975